



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento en la Ciudad de México (SVEDAN)

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

JULIO 2026

SITUACIÓN DE LOS DAN


Número de casos de DAN registrados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, CDMX 2003-2026*

Años	Anencefalia	Encefalocele	Mielomeningocele	Meningocele	Otras Espinas Bifidas	Microcefalia	Otros Defectos Craneofaciales	Labio y paladar hendido	Otras Malformaciones	Displasia del Desarrollo de la Cadera	Total
2003	8	5	41	0	0	0	0	0	0	0	54
2004	23	11	41	6	0	0	1	2	23	0	107
2005	8	4	25	4	1	0	0	0	20	0	62
2006	9	19	12	8	1	0	0	0	0	0	49
2007	11	12	42	8	1	0	0	0	2	0	76
2008	10	3	41	2	5	2	2	0	16	0	81
2009	10	6	18	3	0	1	22	0	0	0	60
2010	10	5	29	4	2	2	37	0	0	0	89
2011	4	3	33	5	1	2	53	0	0	0	101
2012	4	7	29	9	3	5	54	0	0	0	111
2013	7	3	25	3	0	1	36	0	0	0	75
2014	19	4	18	0	4	0	11	0	20	0	76
2015	9	5	18	4	2	2	23	0	32	0	95
2016	9	12	46	1	7	21	57	30	1	0	184
2017	5	6	36	0	6	33	49	39	0	0	174
2018	8	3	36	0	8	18	46	33	0	0	152
2019	5	7	34	1	4	23	57	75	0	0	206
2020	1	4	20	0	2	13	33	48	0	0	121
2021	6	4	25	6	6	5	41	57	0	0	150
2022	15	4	21	5	3	15	96	95	0	51	305
2023	20	10	46	4	8	18	123	134	0	31	394
2024	11	9	35	4	8	10	134	136	0	19	366
2025	10	5	43	6	9	14	117	147	0	9	360
2026	7	4	24	4	5	6	55	50	0	4	159
Total	212	146	671	77	72	171	875	649	114	101	3088

A partir del 2016 se observa en Ciudad de México un aumento en la notificación de casos de Defectos al Nacimiento al agregarse la vigilancia de Microcefalia debido a su asociación con Zika y recientemente (2022) la Displasia del Desarrollo de la Cadera, además de la implementación de plataforma digital para notificación de casos.

SITUACIÓN DE LOS DAN

Incidencia por tipo de DAN y año de nacimiento, CDMX 2003-2026*



Fuente: SINAVE/DAN/SSPCDMX/DEMP/corte al 30/06/2026
*Hasta la Semana Epidemiológica No. 26
** Tasa por 10,000 NV

Situación de los DAN, Ciudad de México 2026*

Casos de DAN por mes de notificación


Mes	Numero	%
Enero	20	12.6%
Febrero	24	15.1%
Marzo	24	15.1%
Abril	23	14.5%
Mayo	31	19.5%
Junio	37	23.3%
Total	159	100%

Casos de DAN por Jurisdicción

Jurisdicción	Numero	%
Gustavo A. Madero	7	4.4%
Azcapotzalco	50	31.4%
Iztacalco	4	2.5%
Coyoacán	1	0.6%
Álvaro Obregón	23	14.5%
Magdalena Contreras	2	1.3%
Cuajimalpa	1	0.6%
Tlalpan	7	4.4%
Iztapalapa	3	1.9%
Xochimilco	2	1.3%
Milpa Alta	2	1.3%
Tlahuac	0	0.0%
Miguel Hidalgo	39	24.5%
Benito Juárez	1	0.6%
Cuauhtémoc	17	10.7%
Venustiano Carranza	0	0.0%
Total	159	100%

En el mes de junio se notificó el 23.3% de los casos de DAN en la CDMX, la jurisdicción sanitaria Azcapotzalco notificó en mayor proporción.

Casos de DAN por ocurrencia y residencia, CDMX 2026*



De los 159 casos notificados hasta la semana epidemiológica 26 de observa que solo 72 de estos casos son con residencia en la Ciudad de México


Casos de DAN por mes de nacimiento y mes de notificación, CDMX 2026*

Mes notificación	Mes de nacimiento						Total casos not. Mes
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Enero	20	0	0	0	0	0	20
Febrero	4	20	0	0	0	0	24
Marzo	0	2	22	0	0	0	24
Abril	0	0	3	20	0	0	23
Mayo	0	0	2	4	25	0	31
Junio	2	0	0	0	3	32	37
Total	26	22	27	24	28	32	159

-  Número total de recién nacidos en el mes correspondiente
-  Total de casos notificados de forma oportuna
-  Casos notificados fuera del tiempo, en otro mes.


Casos de DAN notificados por institución, CDMX 2026*

Institución	Número	%
IMSS OR	49	54%
IMSS_OPD	16	18%
ISSSTE	1	1%
PEMEX	1	1%
PRIVADOS	4	4%
SSA	20	22%
Total	91	100%



Casos de DAN notificados según estado de residencia , CDMX 2026*

Entidad	Número	%
Chiapas	1	1.1%
Ciudad de México	45	49.5%
México	32	35.2%
Veracruz	2	2.2%
Hidalgo	4	4.4%
Morelos	1	1.1%
Queretaro	1	1.1%
Baja California Sur	1	1.1%
Guerrero	3	3.3%
Chihuahua	1	1.1%
Total	91	100%




Durante el segundo trimestre, se han notificado en mayor proporción casos de madres residentes de la Ciudad de México y del Estado de México.


Fuente: SINAVE/DAN/SSPCDMX/DEMP/corte al 30/06/2026

*De la Semana Epidemiológica No. 14 a la 26


Casos de DAN por tipo de Defecto Craneofacial, CDMX 2026*



Casos de DAN por tipo de Malformación y sexo del producto, CDMX 2026*




Casos de DAN, CDMX , por tipo de Defecto de Tubo Neural, CDMX 2026*




En el segundo trimestre la mayor proporción de malformaciones correspondió a Labio y/o Paladar Hendido con 28 casos (40.6%) y Mielomeningocele y ventriculomegalia con 13 casos (14.29%) siendo los diagnósticos más frecuentes del total de casos notificados durante el año.

Fuente: SINAVE/DAN/SSPCDMX/DEMP/corte al 30/06/2026
*De la Semana Epidemiológica No. 14 a la 26


Casos de DAN por sexo del producto, CDMX 2026*



Distribución de casos de DAN por trimestre de embarazo al nacimiento, CDMX 2026*




Casos de DAN según el número de consultas prenatales , CDMX 2026*



Durante el segundo trimestre, la mayor proporción de casos fue del sexo femenino 52% (n=47) , del total de los casos notificados en este periodo la mayor proporción de madres se encontraban en el tercer trimestre de embarazo 89% (n=81), en cuanto al número de consultas prenatales el 33% (n=30) de las mujeres tuvieron más de 10 consultas.


Fuente: SINAVE/DAN/SSPCDMX/DEMP/corte al 30/06/2026
*De la Semana Epidemiológica No. 14 a la 26

Casos de DAN por tipo de comorbilidad de los padres, CDMX 2026*



El 79% (n=147) de los padres y las madres reportaron no estar diagnosticados con alguna comorbilidad, de los que reportaron tener alguna enfermedad la de mayor frecuencia fue diabetes en las madres.


Distribución de casos de DAN por infección materna durante el embarazo CDMX 2026*




El 7.7% (n=7) de las madres reportaron haber cursado con una infección durante algún periodo del embarazo, dentro de las cuales la más frecuente fue la Infección de Vías Urinarias (IVU).

Situación de los DAN, Ciudad de México 2026*

Casos de DTN-CF con Ultrasonido que indica malformación, CDMX 2026*




Casos de DTN-CF por trimestre de realización del ultrasonido, CDMX 2026*



Mas de la mitad de las madres 66% (n=60) contaban con un ultrasonido que indicaba el defecto al nacimiento, de estos ultrasonidos solo el 12% (n=7) se realizó durante el primer trimestre de embarazo.

Casos de DAN según la edad de los padres, CDMX

2026*



48%

Se encuentra entre los 20 y los 29 años.

28 años

Promedio de edad

16 años

Más joven fue de

45 años

Mayor edad fue de

9

Son menores de 20 años



41%

30 años

16 años

49 años

6

Casos de DAN según la ocupación de los padres

Ocupación	Madre		Padre	
	Numero	%	Número	%
Hogar	45	49%	0	0%
Estudiante	12	13%	1	1%
Profesionista	10	11%	9	10%
Industria	3	3%	5	5%
Administrativo	3	3%	7	8%
Comercio	8	9%	16	18%
Construcción	0	0%	8	9%
Agricultura	0	0%	2	2%
Funcionario público	2	2%	2	2%
Choferes	0	0%	6	7%
Servicios personales	4	4%	6	7%
Desempleado	0	0%	3	3%
Artesano	0	0%	1	1%
Otra	4	4%	15	16%
Se Ignora	0	0%	10	11%
Total	91	100%	91	100%

Casos de DAN según la escolaridad de los padres

Escolaridad	Madre		Padre	
	Numero	%	Número	%
Primaria	6	6.6%	7	7.7%
Secundaria	19	20.9%	22	24.2%
Preparatoria	35	38.5%	27	29.7%
Carrera Técnica	2	2.2%	3	3.3%
Licenciatura	27	29.7%	21	23.1%
Posgrado	1	1.1%	1	1.1%
Ninguna	1	1.1%	0	0.0%
Otra	0	0.0%	0	0.0%
Se ignora	0	0.0%	10	11.0%
Total	91	100%	91	100%

El 49% (N=45) de las madres refirió dedicarse al hogar mientras que el 18% (N=16) de los padres refieren ser comerciantes.

Casos de DAN con antecedentes de adicciones de los padres, CDMX 2026*

Adicción	Madre		Padre	
	Número	%	Número	%
Tabaco	11	11.3%	12	12.4%
Alcohol	7	7.2%	17	17.5%
Inhalables	2	2.1%	1	1.0%
Inyectables	0	0.0%	0	0.0%
Otra	1	1.0%	1	1.0%
Ninguna	76	78.4%	56	57.7%
Se ignora	0	0.0%	10	10.3%
Total	97	100%	97	100%

En cuanto a las adicciones más de la mitad de las madres reportaron no contar con antecedentes, sin embargo el reporte en el consumo de alcohol y tabaco fueron las adicciones más frecuentes.

Casos de DAN con antecedentes de ingesta de ácido fólico de los padres, CDMX 2026*


Toma de ácido fólico	Madre		Padre	
	Numero	%	Número	%
Un año previo al embarazo	4	4%	2	2%
Tres meses previos al embarazo	8	9%	1	1%
Durante el primer trimestre	59	65%	0	0%
Después del primer trimestre	16	18%	0	0%
No tomó	4	4%	78	86%
Se ignora	0	0%	10	11%
Total	91	100%	91	100%

La ingesta del ácido fólico en mayor proporción fue reportada por las madres durante el primer trimestre de embarazo, en cuanto a los padres el reporte más frecuente fue No Tomó.


Fuente: SINAVE/DAN/SSPCDMX/DEMP/corte al 30/06/2026

*De la Semana Epidemiológica No. 14 a la 26

Casos de DAN por realización de Tamiz Metabólico, CDMX 2026*




Casos de DAN por realización de Tamiz Auditivo, CDMX 2026*




Casos de DAN por exposición a medicamentos o sustancias de las madres y padres, CDMX 2025*

Madres



El 1% (n=1) de las madres reportó alguna exposición previa al embarazo, mientras que el 4% (N=4) lo reportó durante el embarazo. Los medicamentos a los que reportaron haber presentado exposición son los siguientes: aine/relajante muscular, hipoclorito/desengrasante, ampicilina, dexametasona metotrexato y thinner

Padres



El 5% (n=4) de los padres reportó alguna exposición previo embarazo mientras que el 1% (n=1) lo reportó durante el embarazo, Los medicamentos a los que reportaron haber presentado exposición son los siguientes: solventes, pesticidas, thinner

Directorio:

Dra. Nadine Gasman Zylbermann

Secretaría de Salud de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Dr. Mauricio López Manning

Asesor Encargado de los Asuntos de la Dirección General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Dr. Nivaldo Linares López


Director de Epidemiología y Medicina Preventiva

Dr. Flavio Alejandro Céspedes Meneses

Subdirector de Enfermedades No Transmisibles

C.D. Xochitl Salvador Montaña

Responsable Estatal del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento CDMX



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN