

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 15/03/2026



Emisión Vespertina: 12:00 horas

Semana N° 11

Informe N°: 084

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME METEOROLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEMA	FUENTE	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Pronóstico Meteorológico Nacional		PRONOSTICO PARA EL VALLE DE MÉXICO Por la mañana, prevalecerá el cielo despejado y ambiente fresco con bruma. Por la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas. - Temperatura mínima registrada en el observatorio de Tacubaya, CDMX: 12.3 °C. - Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C. - Viento de dirección variable 5 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.	https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticosubmenu/pronostico-regional-para-el-valle-de-mexico	BAJA
Pronóstico Meteorológico Estatal		BOLETÍN METEOROLÓGICO Este domingo se espera cielo mayormente despejado con aumento de nublados por la tarde, ambiente muy caluroso y condiciones limitadas para lluvias. Los vientos serán variables de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h. La madrugada del lunes será fría en zonas altas y fresca en el valle. Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.   TEMPERATURAS MINIMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  TEMPERATURA MÁXIMA  PRONÓSTICO DE LLUVIAS ACUMULADAS EN 24 HORAS 	https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletin https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/redalertatatemprana	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 15/03/2026

Emisión Vespertina: 12:00 horas


Semana N° 11

Informe N°: 084

PRONÓSTICO DE TRAYECTORIA DE CENIZAS PARA LAS PRÓXIMAS 24 HRS.

SIN PROBABILIDAD DE CAÍDA DE CENIZAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DEL MONITOREO AL VOLCÁN POPOCATÉPETL



Se detectaron 10 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos. Se contabilizaron 47 minutos de temblor armónico de baja amplitud y armónico. Durante la mañana y al momento de este reporte se observa una emisión continua de vapor de agua y gases volcánicos en dirección oeste-suroeste (OSO). En caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y/o vapor de agua, el modelo Hysplit (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una altura de posible emisión a 500 metros sobre el cono volcánico que está a 5,426 metros AMSL "sobre el nivel medio del mar" (3,216 metros AGL "sobre el nivel del suelo"), indica trayectorias hacia el sur, cambiando al suroeste (simulando exhalación cada hora, 6) a su paso por la zona oeste del Estado de Puebla; zona este del Estado de Morelos; para las primeras 12 horas pronosticadas (10:00 a las 22:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas pronosticadas (22:00 a las 10:00 hora local) las trayectorias continuarán sobre la zona noreste y centro del Estado de Guerrero. Dichas trayectorias, pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas procedentes del Volcán Popocatepetl.



Dirección del viento
OESTE-SUROESTE



El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatepetl se encuentra en **AMARILLO FASE 2**.

Condiciones para dispersión de ceniza del Volcán Popocatepetl – 15/03/2026 07:00 horas

Webcam:
Mediante webcam se observa emisión de vapor de agua con contenido ligero de ceniza volcánica.



Condiciones actuales:
El VAAC-NOAA de Washington no reporta emisión reciente de ceniza volcánica. En la imagen de satélite no se observa pluma de ceniza.



Dispersión de ceniza a 24 horas:
En caso de emisión de ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Sur-Sureste sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.



<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/aviso-especial-por-la-actividad-del-volcan-popocatepetl>

<https://www.cenapred.unam.mx/reportesVolcanesMX/>

BAJA

Monitoreo
Volcánico



INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 15/03/2026

Emisión Vespertina: 12:00 horas

Semana N° 11

Informe N°: 084

Monitoreo
Sismológico



Al momento de elaborar este informe, el Servicio Sismológico Nacional reporta **19 sismos** ocurridos el día de hoy, de los cuales:

Con magnitud de 1.0 a 3.9:
18

Con magnitud de 4.0 a 4.9:
01

Con magnitud mayor o igual a 5.0
00

Sismo de mayor magnitud registrado en las últimas 24 horas:

Sismo magnitud 4.0 ocurrido el día 2026-03-15 09:04:42 (hora del centro) a 13 KM AL NOROESTE de VILLA DE ÁLVAREZ, COL. profundidad 32.9 km



NINGUNO PERCEPTIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

BAJA

<http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/>


Monitoreo
Calidad del Aire
en la Ciudad de México



CALIDAD DEL AIRE HOY



Recomendación UV:



BAJA

<http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php>

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 15/03/2026

Emisión Vespertina: 12:00 horas

Semana N° 11

Informe N°: 084

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DEFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
NOTICIAS INTERNACIONALES				
La OPS alerta sobre transmisión sostenida de fiebre amarilla en partes de Sudamérica	  	La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante la persistencia de la transmisión de fiebre amarilla en varios países de Sudamérica y la aparición de casos en zonas donde anteriormente no se registraba circulación del virus. Desde finales de 2024 se han identificado infecciones fuera de los focos tradicionales de la cuenca amazónica, lo que ha motivado el llamado a fortalecer la vigilancia epidemiológica, intensificar las campañas de vacunación en poblaciones en riesgo y garantizar que los viajeros a áreas endémicas cuenten con protección adecuada. En 2025 se notificaron 346 casos confirmados y 143 defunciones en siete países de la región, entre ellos Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela. Asimismo, durante las primeras semanas de 2026 se confirmaron 34 casos humanos y 15 fallecimientos en Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, lo que evidencia la continuidad de la transmisión y mantiene elevada la preocupación sanitaria regional. La OPS destacó que el ciclo selvático de la enfermedad —en el cual el virus circula entre mosquitos y primates no humanos— se reactiva periódicamente; sin embargo, la detección reciente de casos en zonas cercanas a áreas urbanas incrementa el riesgo de transmisión urbana mediada por el mosquito <i>Aedes aegypti</i>, lo que podría favorecer brotes de rápida propagación. Ante este escenario, la organización mantiene la clasificación de riesgo alto para la salud pública en las Américas debido al aumento de casos, la elevada letalidad y la expansión geográfica del virus. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede causar cuadros graves y potencialmente mortales. Aunque no existe tratamiento específico, la vacunación constituye la medida preventiva más eficaz y una sola dosis proporciona protección de por vida. En este sentido, la OPS recomienda mantener coberturas de vacunación de al menos 95 % en las poblaciones expuestas, reforzar la vigilancia epidemiológica y de epizootias en primates —como sistema de alerta temprana—, así como fortalecer las acciones de control vectorial y la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Además, se aconseja que los viajeros a zonas de riesgo se vacunen al menos 10 días antes del viaje para reducir la probabilidad de infección y limitar la propagación de la enfermedad.	https://www.paho.org/es/noticias/13-3-2026-ops-alerta-sobre-transmision-sostenida-fiebre-amarilla-partes-sudamerica	BAJA
NOTICIAS NACIONALES				
Actualización sobre la falsificación del producto Keytruda® 100 mg/4 mL (pembrolizumab), solución inyectable	  	Alerta sanitaria por falsificación de Keytruda® La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) actualizó la alerta sanitaria sobre la falsificación del medicamento Keytruda (pembrolizumab) 100 mg/4 mL, solución inyectable, utilizado en el tratamiento de diversos tipos de cáncer. La actualización se emitió tras la identificación de nuevos números de lote falsificados detectados en el territorio nacional. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa Merck Sharp & Dohme, titular del registro sanitario, los lotes Y005560 y DR82765 presentan irregularidades, las cuales se suman a los lotes previamente reportados Y011745 y Y005786. Entre las anomalías detectadas se encuentra la ausencia del principio activo tras análisis del producto, así como información del etiquetado en idioma inglés y números de lote que no corresponden a la fabricación oficial de la compañía. La autoridad sanitaria señaló que, al tratarse de un producto falsificado, se desconoce su procedencia y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los pacientes. Ante esta situación, COFEPRIS recomendó a profesionales de la salud, distribuidores y población en general verificar el envase y etiquetado antes de utilizar cualquier medicamento, evitar la adquisición de los lotes señalados y comprar únicamente en establecimientos autorizados. Asimismo, se exhorta a reportar sospechas de comercialización irregular o reacciones adversas a través del sistema de farmacovigilancia (VigiRam).	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1065137/Alerta_Sanitaria_Keytruda_13032026.pdf	MEDIA
Robo de medicamentos a la empresa SANDOZ, S.A. DE C.V.	  	Alerta sanitaria por robo de medicamentos de la empresa Sandoz La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria tras el robo de diversos medicamentos notificado por la empresa Sandoz, ocurrido en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Entre los productos sustraídos se encuentran Bentabud (budesonida), Dolotandax (naproxeno/paracetamol), Fludarabina, Hyrimoz (adalimumab), Omnitrope (somatropina), Teriem (teriflunomida), Zarzio (filgrastim) y Zofran (ondansetrón), correspondientes a distintos números de lote y fechas de caducidad. La autoridad sanitaria precisó que los productos robados no representan la totalidad de los lotes fabricados o importados, sin embargo, se emitió la alerta como medida preventiva para evitar su posible comercialización irregular. COFEPRIS advirtió que la venta o distribución de medicamentos robados representa un riesgo sanitario, debido a que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1065136/Alerta_Sanitaria_Robo_Sandoz_13032026.pdf	MEDIA



INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 15/03/2026

Emisión Vespertina: 12:00 horas

Semana N° 11

Informe N°: 084

		almacenamiento posteriores al robo, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Ante esta situación, la autoridad recomendó a la población no adquirir medicamentos en la vía pública o establecimientos informales, así como verificar que su compra se realice en establecimientos autorizados y con receta médica cuando corresponda. Asimismo, exhortó a distribuidores y farmacias a adquirir medicamentos únicamente a través de distribuidores autorizados y comprobar la documentación que avale su legal procedencia.		
Robo de medicamento a la empresa PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. Categoría: Alerta sanitaria de medicamentos Lugar de expedición: Ciudad de México Fecha de expedición: 13 de marzo de 2026		Alerta sanitaria por robo del medicamento Lodicar® La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria tras el robo del medicamento Lodicar (amlodipino), notificado por la empresa Productos e Insumos para la Salud, ocurrido en el estado de Puebla. El producto sustraído corresponde a la presentación de frasco con 30 tabletas de 5 mg, lote 241104, con fecha de caducidad junio de 2026. La autoridad sanitaria precisó que el medicamento robado no representa la totalidad del lote fabricado o importado; sin embargo, la alerta se emitió de manera preventiva para evitar su posible comercialización irregular. COFEPRIS advirtió que la distribución o venta de medicamentos robados constituye un riesgo sanitario, debido a que se desconocen las condiciones de manejo, almacenamiento y transporte posteriores al robo, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Ante esta situación, la autoridad recomendó a la población no adquirir medicamentos en la vía pública o en establecimientos informales, así como utilizar este fármaco únicamente bajo supervisión médica y con receta. Asimismo, exhortó a distribuidores y farmacias a verificar la procedencia legal del medicamento y adquirirlo únicamente a través de distribuidores autorizados, además de reportar cualquier sospecha de comercialización irregular o reacciones adversas mediante el sistema de farmacovigilancia correspondiente.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1065134/Alerta_Sanitaria_Robo_Productos_e_Insumos_para_la_Salud_13_032026.pdf	MEDIA
Refuerza IMSS atención a niñas, niños y adolescentes con cáncer con implementación de catéter PICC		IMSS fortalece la atención oncológica pediátrica con dispositivos de acceso vascular especializado El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece la atención integral de pacientes pediátricos con cáncer mediante la implementación de catéteres centrales de inserción periférica (PICC) en adolescentes y la consolidación del uso de catéteres puerto (Port-a-Cath), con el objetivo de mejorar la seguridad y continuidad en la administración de quimioterapia y otros tratamientos intravenosos prolongados. Durante una reunión virtual con madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos, el coordinador de Oncología, Donación y Trasplantes del IMSS, Enrique López Aguilar, señaló que la institución avanza en la adopción de tecnologías basadas en evidencia científica para mejorar los resultados clínicos y la calidad de la atención. En este sentido, destacó que más del 95 % de los pacientes pediátricos con cáncer requieren terapia de infusión, por lo que es fundamental contar con dispositivos que garanticen un acceso vascular seguro. Asimismo, explicó que los PICC permiten la administración segura de medicamentos vesicantes y otros fármacos de alto riesgo utilizados en quimioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas, siendo particularmente útiles en tratamientos que se extienden de 30 días hasta seis meses. Por su parte, los catéteres puerto se emplean en esquemas intermitentes o de mayor duración, generalmente superiores a seis meses, por lo que la elección del dispositivo depende del tipo y duración del tratamiento, así como de las condiciones clínicas de cada paciente. De acuerdo con el especialista, la incorporación de estas tecnologías contribuye a reducir complicaciones como dolor, flebitis, daño tisular y extravasaciones, además de evitar punciones repetidas y facilitar la continuidad terapéutica. Finalmente, el IMSS informó que la plataforma institucional de registro de tratamientos oncológicos suma 25 mil 367 pacientes, de los cuales 31 % corresponde a población pediátrica, atendidos en 82 hospitales del país, incluyendo 16 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).	https://www.gob.mx/imss/prensa/refuerza-imss-atencion-a-ninas-ninos-y-adolescentes-con-cancer-con-implementacion-de-cateter-picc?idiom=es	BAJA
En jornada de cataratas, Centro de Cirugía Ambulatoria del HR "1° de Octubre" del ISSSTE beneficia a 53 derechohabientes		Jornada de cirugía de cataratas beneficia a adultos mayores en el ISSSTE Especialistas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizaron la primera jornada de cirugía de cataratas de 2026 en el Centro de Cirugía Ambulatoria del Hospital Regional "1° de Octubre" del ISSSTE, ubicado en la Ciudad de México, donde se benefició a 53 derechohabientes adultos mayores. De acuerdo con la directora del Centro de Cirugía Ambulatoria, Claudia Obil Obil, del total de pacientes atendidos 33 fueron mujeres y 20 hombres, con edades entre 59 y 86 años; además, seis de ellos provenían de Huejutla, en el estado de Hidalgo, mientras que el resto era originario de la capital del país. La especialista explicó que la cirugía de cataratas es un procedimiento poco invasivo e indoloro, con una duración aproximada de siete a 14 minutos, que permite mejorar significativamente la visión en un periodo cercano a 24 horas. Asimismo, destacó que este tipo de intervenciones contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ya que favorece su independencia, facilita la realización de actividades cotidianas y fortalece su integración social y familiar. Finalmente, el instituto informó que se prevé realizar nuevas jornadas quirúrgicas en los próximos meses, como parte de los esfuerzos para ampliar el acceso a la atención oftalmológica. En esta jornada participaron 68 integrantes del personal de salud, entre enfermería, técnicos y personal administrativo, quienes garantizaron la atención segura de los pacientes.	https://www.gob.mx/issste/prensa/en-jornada-de-ataratas-centro-de-cirugia-ambulatoria-del-hr-1-de-octubre-del-issste-beneficia-a-53-derechohabientes	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 15/03/2026

Emisión Vespertina: 12:00 horas

Semana N° 11

Informe N°: 084

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS NO OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Activan Alerta Amarilla en CDMX por temperaturas bajas para el domingo 15 de marzo	La Razón	Activan alerta preventiva por bajas temperaturas en la Ciudad de México La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó Alerta Amarilla en la Tlalpan, ante el pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y la mañana del 15 de marzo. De acuerdo con la dependencia, se prevén temperaturas mínimas entre 4 y 6 °C, con posibilidad de sensación térmica menor debido a la presencia de viento. Ante estas condiciones, las autoridades advirtieron que el descenso térmico representa riesgo moderado para la población, particularmente para niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas. Asimismo, se espera cielo mayormente despejado acompañado de ambiente frío en las primeras horas del día. Por ello, se recomendó a la población abrigarse con varias capas de ropa, evitar la exposición prolongada al frío y mantener una adecuada hidratación y alimentación. Además, se exhortó a utilizar calefactores y estufas con precaución para prevenir accidentes, así como a proteger a mascotas y animales domésticos. Finalmente, la dependencia indicó que la Alerta Amarilla es un aviso preventivo que busca informar a la población y promover medidas de prevención ante condiciones climatológicas adversas. En caso de registrarse un descenso mayor en la temperatura, la alerta podría elevarse a nivel Naranja, por lo que se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales de protección civil y del Servicio Meteorológico Nacional.	https://www.razon.com.mx/ciudad/2026/03/14/activan-alerta-amarilla-en-cdmx-por-temperaturas-bajas-para-el-domingo-15-de-marzo/?utm_source=chatgpt.com	BAJA
Lo que los hombres no saben del VPH: No es 'sólo cosa de mujeres' y puede provocar muchos tipos de cáncer	MILENIO*	Las infecciones por el virus del papiloma humano no solo afectan a las mujeres: existen registros de que el agente infeccioso se asocia a algunos tipos de cáncer en hombres. Las infecciones por el virus del papiloma humano (VPH) constituyen una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes a nivel mundial y, aunque comúnmente se asocian con las mujeres, también afectan a los hombres y pueden relacionarse con diversos tipos de cáncer. De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la infección por VPH puede presentarse en personas de cualquier sexo, ocasionando verrugas genitales y, en algunos casos, procesos oncológicos cuando determinadas cepas persisten en el organismo. El VPH comprende más de 200 tipos de virus que, en la mayoría de los casos, son eliminados por el sistema inmunológico sin provocar síntomas. Sin embargo, cuando las variantes de alto riesgo permanecen durante largos periodos, pueden generar lesiones celulares que, con el tiempo, evolucionan hacia cáncer. Se estima que más del 90 % de los casos de cáncer cervicouterino están asociados a esta infección, particularmente a los tipos 16 y 18, aunque también se relaciona con cánceres de vulva, vagina, ano, pene y orofaringe. Diversos estudios han evidenciado que el VPH también tiene un impacto significativo en la salud masculina. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que en 2019 el virus fue responsable de aproximadamente 620 mil casos de cáncer en mujeres y alrededor de 70 mil diagnósticos en hombres. Asimismo, investigaciones recientes señalan que cerca del 70 % de los carcinomas escamosos orofaríngeos están vinculados con cepas de alto riesgo, especialmente el tipo 16, y que hasta el 90 % de los cánceres anales se relacionan con infecciones persistentes. La evolución hacia cáncer suele ser un proceso lento. Las células cervicales infectadas pueden tardar entre cinco y diez años en desarrollar lesiones precancerosas y hasta dos décadas en convertirse en cáncer. No obstante, factores como el tabaquismo, la inmunosupresión, la infección por VIH o la presencia de variantes virales altamente agresivas pueden acelerar este proceso. A pesar de su impacto, el VPH no es sinónimo de cáncer, ya que la detección temprana y la prevención permiten reducir significativamente el riesgo. La vacunación, el uso de métodos de barrera durante las relaciones sexuales y las pruebas de detección —especialmente en mujeres— constituyen estrategias clave para evitar complicaciones. En este contexto, uno de los principales desafíos en salud pública es ampliar las estrategias de vacunación y vigilancia hacia la población masculina, ya que muchos hombres pueden actuar como portadores asintomáticos y contribuir a la transmisión del virus. Incorporar a ambos sexos en los programas de prevención y diagnóstico resulta fundamental para disminuir la carga de enfermedad asociada al VPH y reducir la incidencia de cáncer relacionado con este virus.	https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/vph-y-cancer-mitos-riesgos-en-hombres-y-prevencion	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 15/03/2026

Emisión Vespertina: 12:00 horas

Semana N° 11

Informe N°: 084

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA LÍNEA 55-5038-1700 EXT. 1624 y 5724

SE RECIBIERON **00** LLAMADAS DURANTE LA JORNADA

NOTINMED

SIN EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

Se realizó monitoreo a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, sin reportar eventos de interés epidemiológico por el momento.

Dra. Nadine Gasman Zylbermann
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Dra. Carolina Sánchez Rodríguez
Responsable Estatal del Programa Emergencias en Salud de la Ciudad de México

Mtro. Mauricio López Manning
Asesor encargado de la Dirección General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Dr. José Fernando Ojeda Fortoul
Responsable del Programa VIH y Sífilis congénita

Dr. Nivaldo Linares Pérez
Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Ing. Carlos Alberto Castro Vallejano
Responsable Estatal del Programa Seguridad Vial y Prevención de Accidente en Grupos Vulnerables

M.S.P. José Ignacio Ruiz Mendoza
Subdirector de Proyectos e Intervenciones Estratégicas de los Servicios de Salud Pública de la ciudad de México

Raúl Trujano Navarrete
Responsable del Programa de Sistema de Vigilancia epidemiológica de las Adicciones (SISVEA)

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la información en este correo electrónico y sus adjuntos contiene datos personales e información técnica, legal, confidencial y privilegiada; por lo que su uso es solo para áreas técnicas correspondientes y acciones necesarias que de ella deriven.