




TEMPORADA DE INFLUENZA INTERESTACIONAL 2025

Gráfica 1. Curva epidémica de casos positivos a influenza por semana epidemiológica y por temporadas interestacionales 2020-2025



Al comparar el comportamiento de la curva epidémica semanal de influenza en la Ciudad de México de las últimas 5 temporadas, se observó que en la temporada interestacional 2025, la curva de casos de influenza está por encima de la temporada anterior (2024) pero por debajo de la temporada 2023. (Gráfica 1).

Evento	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos positivos influenza	0	1	77	313	86	86
Defunciones por influenza	0	2	0	4	2	1

Nota: Cada periodo presenta información de la semana epidemiológica 21 a la 34

En la temporada interestacional de influenza 2025, han ocurrido 86 casos de influenza y 1 defunción por este padecimiento (Tabla 1).

Tabla 2. Casos sospechosos (ETI/IRAG), positivos y defunciones por influenza.

	Acumulado SEM-21- 34	Semana 34
Casos ETI/IRAG	4,632	169
ETI	2838 (61.3%)	123 (61.3%)
IRAG	1794 (38.7%)	46 (38.7%)
Casos positivos influenza	86 (1.9%)	1 (1.9%)
Defunciones por influenza	1	0


ETI: Enfermedad tipo influenza

IRAG: Infección respiratoria aguda grave

Desde la semana 21 y hasta el corte de la semana 34 de 2025, se han notificado 4,632 casos de ERV* (61% ETI y 39% IRAG), 86 casos positivos a influenza y 1 defunción. En la última semana han ocurrido 169 casos de ERV, 1 casos de influenza confirmado (Tabla 2).

*Enfermedad respiratoria viral

Gráfica 2. Casos ETI/IRAG por semana epidemiológica



De acuerdo con la distribución de los casos de ETI/IRAG, en la temporada interestacional de influenza 2025, se observa una mayor proporción de enfermedad tipo influenza, respecto la infección respiratoria aguda grave, con una tendencia ligeramente descendente en cuanto al número de casos notificados por las USMER (Gráfica 2).



INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

INFLUENZA

Tabla 3. Casos y defunciones por influenza según subtipo viral.


Subtipo viral	Temporada interestacional		
	2024	2025	Cambio %
AH1N1pdm09			
Casos	3	51	1600.0
Defunciones	0	0	-
AH3N2			
Casos	34	5	-85.3
Defunciones	1	0	-100.0
A No subtipificable			
Casos	4	9	125.0
Defunciones	0	0	-
B			
Casos	45	21	-53.3
Defunciones	1	1	0.0
Total general			
Casos	86	86	0.0
Defunciones	2	1	-50.0

Nota: Al corte de la semana 34 para cada temporada


Durante la temporada interestacional 2025, se han confirmado 86 casos positivos a influenza: 51 (59%) de AH1N1, 21 (24%) de influenza B, 9 (10%) de influenza A No subtipificable y 5 (6%) de AH3N3.

Ha ocurrido 1 defunción por influenza B (Tabla 3).

Gráfica 3. Distribución de casos positivos a influenza por subtipo viral y semana epidemiológica



Gráfica 4. Distribución de casos y defunciones por influenza por semana epidemiológica



De acuerdo con la vigilancia por laboratorio, al inicio de la temporada estacional, los casos positivos se distribuyen de la siguiente manera:

- 76% influenza A: AH1N1 Pmd09 (78%), A No Subtipificable (14%) y AH3N2 (8%)
- 24% de influenza B: Victoria (67%) y No determinado (33%).

La positividad de influenza acumulada en el periodo es del 2.9%, con un máximo del 11% en la semana 21 (Gráfica 3).

Con base en el comportamiento por semana epidemiológica, la **semana 21** ha sido la de mayor ocurrencia de casos ($n=28$) de influenza (Gráfica 4).

Tabla 4. Casos de IRA, Neumonía/Bronconeumonía

Diagnóstico	2024	2025	% de cambio
Casos de IRA	244,194	234,767	-3.9
Casos de Neumonía/Bronconeumonía	3,052	3,552	16.4

IRA: Infecciones respiratorias agudas

Nota: Al corte de la semana 32 para cada temporada

Al comparar el comportamiento de los casos IRA y Neumonías/Bronconeumonía al corte de la semana 32 de la temporada estacional actual y la anterior, se observa un decremento del 3.9% y un incremento del 16% respectivamente, de acuerdo con el Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (Tabla 4).



INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA


INFLUENZA

Tabla 5. Casos ETI/IRAG, positivos y defunciones por influenza distribuidos por Alcaldía de Residencia.

Jurisdicción Sanitaria	Casos ETI/IRAG		Casos positivos a influenza		Índice de positividad (%)	Muestras procesadas	Defunciones por influenza	
	n	%	n	%			n	%
AZCAPOTZALCO	242	5.1	2	2.1	1.36	147	0	0.0
COYOACAN	532	11.2	14	14.4	3.73	375	0	0.0
CUAJIMALPA DE MORELOS	58	1.2	2	2.1	4.76	42	0	0.0
GUSTAVO A. MADERO	439	9.3	8	8.2	2.67	300	0	0.0
IZTACALCO	384	8.1	2	2.1	1.27	158	0	0.0
IZTAPALAPA	599	12.6	11	11.3	2.53	435	0	0.0
LA MAGDALENA CONTRERA	130	2.7	3	3.1	3.85	78	0	0.0
MILPA ALTA	66	1.4	2	2.1	5.41	37	0	0.0
ALVARO OBREGON	396	8.4	8	8.2	3.23	248	0	0.0
TLAHUAC	116	2.4	2	2.1	2.94	68	0	0.0
TLALPAN	742	15.7	24	24.7	5.78	415	1	100.0
XOCHIMILCO	224	4.7	7	7.2	4.27	164	0	0.0
BENITO JUAREZ	280	5.9	3	3.1	1.69	178	0	0.0
CUAUHTEMOC	271	5.7	7	7.2	3.33	210	0	0.0
MIGUEL HIDALGO	157	3.3	1	1.0	1.20	83	0	0.0
VENUSTIANO CARRANZA	105	2.2	1	1.0	1.27	79	0	0.0
CDMX	4,741	100.0	97	100.0	3.22	3,017	1	100

De acuerdo con la distribución por Alcaldía de residencia, el mayor número de casos de ETI/IRAG se observa en Tlalpan (16%), Iztapalapa (13%) y Coyoacán (11%). Los casos confirmados de influenza se distribuyen principalmente en Tlalpan (25%), Coyoacán (14%) e Iztapalapa (11%), respectivamente. La defunción por influenza corresponde a Tlalpan (Tabla 5).


Gráfica 5. Casos positivos a influenza por grupos de edad y subtipo viral



De acuerdo con la distribución por grupos de edad, la media de edad de los casos de influenza es de 45 años y se distribuyen principalmente en el grupo de mayores de 65 años, 55 a 59 años y de 45 a 49 años, respectivamente

La defunción ocurrida corresponde al grupo de edad de 40 a 44 años (Gráfica 5).


Gráfica 6. Casos positivos a influenza por sexo



De acuerdo con la distribución por sexo, el 62% de los casos confirmados han sido mujeres (Gráfica 6).



Gráfica 7. Comportamiento de los subtipos virales de influenza durante las temporadas interestacionales 2020-2025



Durante las temporadas interestacionales previas se observó un predominio de circulación de influenza B e influenza AH1N1pdm09. En la temporada interestacional anterior se observó predominio de influenza B (52%). En la presente temporada interestacional, el subtipo predominante es AH1N1 (59%) (Gráfica 7).

Informe semanal de la temporada de influenza interestacional 2025 (Semana 21-39)/Semana 34

Notas aclaratorias

- La vigilancia de influenza se realiza bajo la estrategia centinela y sindromática avalada por la OMS con base en los criterios de Enfermedad tipo influenza e Infección respiratoria aguda grave (ETI/IRAG) y confirmación por laboratorio para conocer la positividad y la subtipificación de los casos. La información se obtiene de 454 Unidades de Salud Monitors de Influenza (USMI) a nivel nacional y 38 (8%) en la Ciudad de México.
- La temporada de influenza interestacional inicia en la semana 21 y termina en la 39 del 2025.
- La información presentada corresponde al corte de la semana 34 y es información preliminar.
- El índice de positividad a influenza se calcula con el total de muestras positivas a influenza entre el total de muestras procesadas con resultado de laboratorio y mide la circulación de influenza en la comunidad.
- Hasta el momento el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos, ni cambios en la virulencia o patogenicidad del virus de influenza. No se han identificado resistencias virales a oseltamivir.
- Los virus presentados como A No subtipificable, corresponden a cepas que fueron identificadas como influenza A por PCR tiempo real, que son negativas a virus AH1N1pdm09 y AH3N2 y no han llegado a los centros de subtipificación o llegaron con muestra insuficiente.

Fuentes:

- SINAVE/SISVER/SSPCDMX/DEMP/semana 34
- SINAVE/SUIVE/SSPCDMX/DEMP/semana 32