




TEMPORADA DE INFLUENZA ESTACIONAL 2025-2026

Gráfica 1. Curva epidémica de casos positivos a influenza por semana epidemiológica y por temporadas estacionales 2020-2021 a 2025-2026



Al comparar el comportamiento de la curva epidémica semanal de influenza en la Ciudad de México de las últimas 5 temporadas, se observa que la temporada de influenza 2025-2026 el comportamiento es menor a lo observado al inicio de las temporadas anteriores (Gráfica 1).

Tabla 1. Casos y defunciones por influenza por temporada estacional.

Evento	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Casos positivos influenza	1	1	59	20	5	2
Defunciones por influenza	0	0	1	0	0	0

Nota: Al corte de la semana 41 para cada temporada

Durante el inicio de la temporada estacional 2025-2026, en la Ciudad de México, se han identificado 2 casos confirmados a influenza.

Tabla 2. Casos sospechosos (ETI/IRAG), positivos y defunciones por influenza.


	Acumulado Semanas 40-41	Semana 41
Casos ETI/IRAG	777	334
ETI	549 (70.7%)	233 (69.8%)
IRAG	228 (29.3%)	101 (30.2%)
Casos positivos influenza	2 (0.3%)	1 (0.3%)
Defunciones por influenza	0	0

ETI: Enfermedad tipo influenza

IRAG: Infección respiratoria aguda grave

Desde de la semana 40 y hasta el corte de la semana 41, se han notificado 777 casos de ERV* (71% ETI y 29% IRAG), 2 casos positivos a influenza y 0 defunciones. En la última semana han ocurrido 334 casos de ERV, 1 caso de influenza confirmados y ninguna defunción (Tabla 2).

Gráfica 2. Casos ETI/IRAG por semana epidemiológica



De acuerdo con la distribución de los casos de ETI/IRAG se observa una mayor proporción de casos de enfermedad tipo influenza respecto a infección respiratoria aguda, al inicio de la temporada estacional 2025-2026 (Gráfica 2).

*Enfermedad respiratoria viral



INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

INFLUENZA


Tabla 3. Casos y defunciones por influenza según subtipo viral.

Subtipo viral	Temporada estacional		
	2024-2025	2025-2026	Cambio %
AH1N1pdm09			
Casos	1	2	100.0
Defunciones	0	0	-
AH3N2			
Casos	3	0	-100.0
Defunciones	0	0	-
A No subtipificable			
Casos	0	0	-
Defunciones	0	0	-
B			
Casos	1	0	-100.0
Defunciones	0	0	-
Total general			
Casos	5	2	-60.0
Defunciones	0	0	-


Nota: Al corte de la semana 41 para cada temporada

Durante la temporada estacional 2025-2026, se han confirmado 2 casos positivos a influenza AH1N1pdm09 (100%), sin la ocurrencia de defunciones (Tabla 3).

Gráfica 3. Distribución de casos positivos a influenza por subtipo viral y semana epidemiológica



Gráfica 4. Distribución de casos y defunciones por influenza por semana epidemiológica



De acuerdo con la vigilancia por laboratorio, al inicio de la temporada estacional, los casos positivos se distribuyen de la siguiente manera:

- 100% influenza A: AH1N1 (100%).
- 0% de influenza B

La positividad de influenza durante el periodo es del 1% (Gráfica 3).

Con base en el comportamiento por semana epidemiológica, en la **semana 40 y 41** han ocurrido 2 casos de influenza (Gráfica 4).

Tabla 4. Casos de IRA, Neumonía/Bronconeumonía

Diagnóstico	2024	2025	% de cambio
Casos de IRA	394,548	365,859	-7.3
Casos de Neumonía/Bronconeumonía	4,717	5,599	18.7

IRA: Infecciones respiratorias agudas

Nota: Al corte de la semana 39 para cada temporada

Al comparar el comportamiento actual de los casos de IRA y Neumonías/Bronconeumonía al corte de la semana 39 respecto de la temporada interestacional 2024, se observa un decremento del 7% y un incremento del 19%, respectivamente, de acuerdo con el Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (Tabla 4).



INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA


INFLUENZA

Tabla 5. Casos ETI/IRAG, positivos y defunciones por influenza distribuidos por Jurisdicción de Residencia.

Jurisdicción de residencia	Casos ETI/IRAG		Casos positivos a influenza		Índice de positividad (%)	Muestras procesadas	Defunciones por influenza	
	n	%	n	%			n	%
AZCAPOTZALCO	44	5.7	0	0.0	0.0	22	0	-
COYOACAN	82	10.6	0	0.0	0.0	44	0	-
CUAJIMALPA DE MORELOS	10	1.3	0	0.0	0.0	4	0	-
GUSTAVO A. MADERO	68	8.8	0	0.0	0.0	37	0	-
IZTACALCO	74	9.5	0	0.0	0.0	18	0	-
IZTAPALAPA	80	10.3	0	0.0	0.0	47	0	-
LA MAGDALENA CONTRERAS	24	3.1	1	50.0	6.7	15	0	-
MILPA ALTA	24	3.1	0	0.0	0.0	13	0	-
ALVARO OBREGON	59	7.6	0	0.0	0.0	28	0	-
TLAHUAC	17	2.2	0	0.0	0.0	12	0	-
TLALPAN	131	16.9	0	0.0	0.0	61	0	-
XOCHIMILCO	31	4.0	0	0.0	0.0	19	0	-
BENITO JUAREZ	38	4.9	0	0.0	0.0	20	0	-
CUAUHTEMOC	35	4.5	1	50.0	3.8	26	0	-
MIGUEL HIDALGO	46	5.9	0	0.0	0.0	14	0	-
VENUSTIANO CARRANZA	14	1.8	0	0.0	0.0	7	0	-
CDMX	777	100.0	2	100.0	0.5	387	0	-


De acuerdo con la distribución por Alcaldía de residencia, el mayor número de casos de ETI/IRAG se observa en Tlalpan (17%), Coyoacán (11%) e Iztapalapa (10%), respectivamente. Los casos confirmados de influenza corresponden a Magdalena Contreras (50%) y Cuauhtémoc (50%) (Tabla 5).

Gráfica 5. Casos positivos a influenza por grupos de edad y subtipo viral



De acuerdo con la distribución por grupos de edad, la media de edad de los casos de influenza es de 32 años y corresponden al grupo de edad de 5 a 9 años y de 55 a 59 años (Gráfica 5).


Gráfica 6. Casos positivos a influenza por sexo



De acuerdo con la distribución por sexo, no hay diferencia en cuanto a la distribución por sexo (Gráfica 6).



Gráfica 7. Comportamiento de los subtipos virales de influenza durante las temporadas estacionales de influenza 2020-2026



Durante las temporadas interestacionales previas se observó un predominio de circulación de influenza B e influenza AH1N1pdm09. En la temporada estacional anterior se observó predominio de influenza AH3N2 (40%). En la presente temporada estacional, el subtipo predominante es influenza AH1N1 (100%) (Gráfica 7).



Informe semanal de la temporada estacional de influenza 2025-2026 (Semanas 40-20)/Semana 41

Notas aclaratorias:

- La vigilancia de influenza se realiza bajo la estrategia centinela y sindrómica avalada por la OMS con base en los criterios de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/IRAG) y confirmación por laboratorio para conocer la positividad y la subtipificación de los casos. La información se obtiene de 475 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria (USMER) a nivel nacional y **38 (8%) en la Ciudad de México**.
- La temporada de influenza estacional inicia en la semana 41 del 2025 y termina en la semana 20 del 2026
- La información presentada corresponde a los casos residentes de la Ciudad de México al corte de la semana 40 de 2025 y es información preliminar.
- El índice de positividad a influenza se calcula con el total de muestras positivas a influenza entre el total de muestras procesadas con resultado de laboratorio y mide la circulación de influenza en la comunidad.
- Hasta el momento el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos, ni cambios en la virulencia o patogenicidad del virus de influenza. No se han identificado resistencias virales a oseltamivir.
- Los virus presentados como A No subtipificable, corresponden a cepas que fueron identificadas como influenza A por PCR tiempo real, que son negativas a virus AH1N1pdm09 y AH3N2 y no han llegado a los centros de subtipificación o llegaron con muestra insuficiente.

Fuentes:

- 1) SINAVE/SISVER /SSPCDMX/DEMP/semana 41
- 2) SINAVE/SUIVE /SSPCDMX/DEMP/semana 39