




TEMPORADA DE INFLUENZA ESTACIONAL 2025-2026

Gráfica 1. Curva epidémica de casos positivos a influenza por semana epidemiológica y por temporadas estacionales 2020-2021 a 2025-2026



Al comparar el comportamiento de la curva epidémica semanal de influenza en la Ciudad de México de las últimas 5 temporadas, se observa que la temporada de influenza 2025-2026 el comportamiento es ligeramente mayor a lo observado la temporada anterior al inicio de las temporadas anteriores (Gráfica 1).

Tabla 1. Casos y defunciones por influenza por temporada estacional.

Evento	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Casos positivos influenza	1	28	706	219	22	56
Defunciones por influenza	0	0	5	3	1	0

Nota: Al corte de la semana 46 para cada temporada

Durante el inicio de la temporada estacional 2025-2026, en la Ciudad de México, se han identificado 56 casos confirmados a influenza.

Tabla 2. Casos sospechosos (ETI/IRAG), positivos y defunciones por influenza.

	Acumulado Semanas 40-46	Semana 46
Casos ETI/IRAG	3,136	312
ETI	1950 (62.2%)	194 (62.2%)
IRAG	1186 (37.8%)	118 (37.8%)
Casos positivos influenza	56 (1.8%)	10 (3.2%)
Defunciones por influenza	0	0


ETI: Enfermedad tipo influenza

IRAG: Infección respiratoria aguda grave

Desde de la semana 40 y hasta el corte de la semana 46, se han notificado 3,136 casos de ERV* (62% ETI y 38% IRAG), 56 casos positivos a influenza y 0 defunciones. En la última semana han ocurrido 312 casos de ERV, 10 casos de influenza confirmados y ninguna defunción (Tabla 2).

*Enfermedad respiratoria viral

Gráfica 2. Casos ETI/IRAG por semana epidemiológica



De acuerdo con la distribución de los casos de ETI/IRAG se observa una mayor proporción de casos de enfermedad tipo influenza respecto a infección respiratoria aguda, durante las 6 primeras semanas de la temporada estacional 2025-2026, con un ligero aumento de la semana 44 a la 45 y un descenso en la última semana (Gráfica 2).

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

INFLUENZA

Tabla 3. Casos y defunciones por influenza según subtipo viral.


Subtipo viral	Temporada estacional		
	2024-2025	2025-2026	Cambio %
AH1N1pdm09			
Casos	2	24	1100.0
Defunciones	0	0	-
AH3N2			
Casos	18	16	-11.1
Defunciones	1	0	-100.0
A No subtipificable			
Casos	1	13	1200.0
Defunciones	0	0	-
B			
Casos	1	3	200.0
Defunciones	0	0	-
Total general			
Casos	22	56	154.5
Defunciones	1	0	-100.0

Nota: Al corte de la semana 46 para cada temporada


Durante la temporada estacional 2025-2026, se han confirmado 56 casos positivos a influenza: 24 (43%) de AH1N1pdm09, 16 (29%) de AH3N2, 13 (23%) de influenza A No subtipificable y 3(5%) de influenza B.

No han ocurrido defunciones por influenza (Tabla 3).

Gráfica 3. Distribución de casos positivos a influenza por subtipo viral y semana epidemiológica



Gráfica 4. Distribución de casos y defunciones por influenza por semana epidemiológica



De acuerdo con la vigilancia por laboratorio, al inicio de la temporada estacional, los casos positivos se distribuyen de la siguiente manera:

- 95% influenza A: AH1N1 (45%), AH3N2 (30%) y influenza A No subtipificable (25%).
- 5 % de influenza B: 67% linaje Victoria y 33% sin linaje determinado.

La positividad de influenza durante el periodo es del 3%, con un máximo de 7.3% en la semana 45 (Gráfica 3).

Con base en el comportamiento por semana epidemiológica, en la **semana 45** han la mayor frecuencia de casos de influenza confirmados (n=23) (Gráfica 4).

Tabla 4. Casos de IRA, Neumonía/Bronconeumonía

Diagnóstico	2024-2025	2025-2026	% de cambio
Casos de IRA	121,863	125,461	3.0
Casos de Neumonía/Bronconeumonía	2,013	2,070	2.8

IRA: Infecciones respiratorias agudas

Nota: Al corte de la semana 44 para cada temporada

Al comparar el comportamiento de la actual temporada 2025-2026, de los casos de IRA y Neumonías/Bronconeumonía al corte de la semana 44 respecto de la temporada estacional anterior, se observa un incremento del 3% y del 2.8%, respectivamente, de acuerdo con el Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (Tabla 4).

**INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA**


INFLUENZA

Tabla 5. Casos ETI/IRAG, positivos y defunciones por influenza distribuidos por Jurisdicción de Residencia.

Jurisdicción de residencia	Casos ETI/IRAG		Casos positivos a influenza		Índice de positividad (%)	Muestras procesadas	Defunciones por influenza	
	n	%	n	%			n	%
AZCAPOTZALCO	186	5.9	6	10.7	5.5	110	0	-
COYOACAN	351	11.2	11	19.6	4.5	245	0	-
CUAJIMALPA DE MORELOS	35	1.1	0	0.0	0.0	17	0	-
GUSTAVO A. MADERO	266	8.5	5	8.9	3.0	169	0	-
IZTACALCO	295	9.4	3	5.4	2.1	143	0	-
IZTAPALAPA	376	12.0	5	8.9	1.8	280	0	-
LA MAGDALENA CONTRERAS	90	2.9	3	5.4	4.7	64	0	-
MILPA ALTA	57	1.8	3	5.4	8.6	35	0	-
ALVARO OBREGON	261	8.3	6	10.7	3.2	185	0	-
TLAHUAC	63	2.0	0	0.0	0.0	38	0	-
TLALPAN	452	14.4	7	12.5	2.6	267	0	-
XOCHIMILCO	140	4.5	3	5.4	3.1	97	0	-
BENITO JUAREZ	155	4.9	1	1.8	1.0	100	0	-
CUAUHTEMOC	146	4.7	3	5.4	2.7	112	0	-
MIGUEL HIDALGO	192	6.1	0	0.0	0.0	61	0	-
VENUSTIANO CARRANZA	71	2.3	0	0.0	0.0	52	0	-
CDMX	3,136	100.0	56	100.0	2.8	1,975	0	-


De acuerdo con la distribución por Alcaldía de residencia, el mayor número de casos de ETI/IRAG se observa en Tlalpan (14%), Iztapalapa (12%) y Coyoacán (11%), respectivamente. Los casos confirmados de influenza corresponden a Coyoacán (20%), Tlalpan (13%), Álvaro Obregón (11%) y Azcapotzalco (11%) (Tabla 5).

Gráfica 5. Casos positivos a influenza por grupos de edad y subtipo viral



De acuerdo con la distribución por grupos de edad, la media de edad de los casos de influenza es de 39 años y corresponden al grupo de edad de mayores de 65 años, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 50 a 54 años y de 55 a 59 años (Gráfica 5).


Gráfica 6. Casos positivos a influenza por sexo



De acuerdo con la distribución por sexo, el 64% corresponden a mujeres (Gráfica 6).



Gráfica 7. Comportamiento de los subtipos virales de influenza durante las temporadas estacionales de influenza 2020-2026



Durante las temporadas interestacionales previas se observó un predominio de circulación de influenza B e influenza AH1N1pdm09. En la temporada estacional anterior se observó predominio de influenza AH3N2 (40%). En la presente temporada estacional, el subtipo predominante es influenza AH1N1 (43%) (Gráfica 7).



Informe semanal de la temporada estacional de influenza 2025-2026 (Semanas 40-20)/Semana 46

Notas aclaratorias:

- La vigilancia de influenza se realiza bajo la estrategia centinela y sindromática avalada por la OMS con base en los criterios de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/IRAG) y confirmación por laboratorio para conocer la positividad y la subtipificación de los casos. La información se obtiene de 475 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria (USMER) a nivel nacional y **38 (8%) en la Ciudad de México**.
- La temporada de influenza estacional inicia en la semana 46 del 2025 y termina en la semana 20 del 2026
- La información presentada corresponde a los casos residentes de la Ciudad de México al corte de la semana 40 de 2025 y es información preliminar.
- El índice de positividad a influenza se calcula con el total de muestras positivas a influenza entre el total de muestras procesadas con resultado de laboratorio y mide la circulación de influenza en la comunidad.
- Hasta el momento el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos, ni cambios en la virulencia o patogenicidad del virus de influenza. No se han identificado resistencias virales a oseltamivir.
- Los virus presentados como A No subtipificable, corresponden a cepas que fueron identificadas como influenza A por PCR tiempo real, que son negativas a virus AH1N1pdm09 y AH3N2 y no han llegado a los centros de subtipificación o llegaron con muestra insuficiente.

Fuentes:

- 1) SINAVE/SISVER /SSPCDMX/DEMP/semana 46
- 2) SINAVE/SUIVE /SSPCDMX/DEMP/semana 44